

Ficha Técnica



Fertilizante orgánico líquido

Nombre comercial:

Groter

Tipo:

Fertilizante orgánico

Composición garantizada:

Macroelementos

Fósforo	P-PO ₄ ⁻	0.18 %
Pentóxido de Fósforo	P ₂ O ₅	0.42 %
Azufre	S-SO ₄ ⁻²	0.08 %
Sulfatos	SO ₄ ⁻²	0.24 %
Sodio	Na ⁺	0.16 %
Potasio	K ⁺	1.38 %
Óxido de Potasio	K ₂ O	1.66 %
Calcio	Ca ⁺²	0.40 %
Óxido de Calcio	CaO	0.56 %
Magnesio	Mg ⁺²	0.02 %
Óxido de Magnesio	MgO	0.03 %

Microelementos

Fierro	Fe ⁻²	6.55 %
Zinc	Zn ⁺²	1.15 %
Cobre	Cu ⁺²	0.07 %
Boro	B ⁺³	0.04 %

Materia orgánica 6.55 %

Nitrógeno total 1.15 %

Modo de acción:

Groter es un fertilizante líquido elaborado especialmente para aplicación foliar, formulado a partir de hidrolizados de proteínas naturales de origen vegetal y bioestimulantes que proporcionan diferentes beneficios nutrimentales a los cultivos.

Por ejemplo:

1. Estimula la floración.
2. Favorece un crecimiento uniforme en el fruto, lo que permite una mayor homogeneidad en la cosecha.
3. Mejora el llenado y engorde de los frutos y a su vez, favorece la maduración de los frutos acentuando su coloración sin disminuir la vida de anaquel de los mismos.

Recomendaciones de uso:

Agite el producto, abra con cuidado y mida con un equipo graduado la cantidad de Groter recomendada y viértala en un recipiente con la mitad de agua, agite y agregue al tanque de aplicación. Finalmente, añada el agua restante sin dejar de agitar. Ajustar pH a 6.5



		Intervalo de seguridad* (días)	
Solanáceas (Tomate, chile, berenjena)	3 a 5 ml/L	Sin límite	Iniciar aplicación vía foliar previo al momento de inicio de la floración y posteriormente en intervalos de 7 a 15 días.
Cucurbitáceas (Calabaza, Pepino, etc.)			
Berries (Arándano, Frambuesa, Grosella, Zarzamora y Fresa)			
Aguacate, Cítricos y Algodoneros.			
Plantas de ornato & Flores			

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Una vez que seque el producto.
 * Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

Métodos para preparar y aplicar el producto: Agite el producto, abra con cuidado y mida con un equipo graduado la cantidad de **Groter** recomendada y viértala en un recipiente con la mitad de agua, agite, agregue al tanque de aplicación y finalmente, añada el agua restante sin dejar de agitar.

Contraindicaciones: No exponer el producto a la luz del sol por periodos muy prolongados.
 No aplicar en horarios de calor intenso, con alta probabilidad de lluvia o cuando la velocidad del viento sea alta.

Incompatibilidad: No se recomienda mezclar **Groter** con otros productos.

Fitotoxicidad: **Groter** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones aquí descritas.

Garantía: El fabricante garantiza que el contenido de este envase se encuentra conforme a las especificaciones de composición del producto. Ni el fabricante ni sus distribuidores se hacen responsables de los resultados que se obtengan por el manejo, dosificación y aplicación del producto, ya que son circunstancias que están fuera de control del fabricante y distribuidor.

Formulado y distribuido por: Fitocare S.A. de C.V. | (667) 307 0081 | ventas@fitocare.mx

