



FICHA TÉCNICA

Tsp

Denominación de tipo: ABONO CE

Sal potásica en bruto con micronutrientes

Nombre comercial: DIOXI TSP[®]

Formulación: Sólido

pH de la formulación: 6,0

Color: Blanco

Solubilidad en agua: Miscible

Categoría de peligro: No aplica

Presentaciones comerciales: 1 kg - 2 kg - 5 kg

Composición percentual: (% en p/p)

Óxido de Potasio (K ₂ O) Soluble en agua	34,50%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,48%
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA	0,48%
Zinc (Zn) soluble en agua	1,04%
Zinc (Zn) quelatado por EDTA	1,04%
Hierro (Fe) quelatado por EDTA	1,29%

Principales compuestos de la formulación:

Potasio (K), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Hierro (Fe).

Grupo: A.3.1

Registro: Reglamento CE 2003/2003.

Descripción: DIOXI TSP[®] es una preparación sólida a base de Potasio, enriquecido con microelementos y hierro quelatado por EDTA, estos ayudan a superar periodos de estrés nutricional. Esta formulación mejora el estado nutritivo de la planta, de forma que promueve un incremento del crecimiento vegetativo y radicular, así como una mayor fortaleza ante condiciones ambientales desfavorables.

Recomendaciones: Se recomienda llevar a cabo un programa de aplicación cada 20 o 30 días. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Recomendaciones específicas: Leer detenidamente la etiqueta del producto a seguir las indicaciones de uso.



Reglamento (CE) n° 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de Octubre de 2003. Apto para su uso en agricultura ecológica conforme a la UNE 1425000 - Insumos utilizables en la producción vegetal ecológica. Fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo.

CULTIVO

DOSIS

APLICACIÓN

Algodonero

Aplicar desde plantación

Cereales

(arroz, avena, cebada, maíz, maíz palomero, mijo, sorgo y trigo)

Cítricos

(lima, limonero, mandarino, naranjo, toronjo)

Crucíferas

(brócoli, col o repollo, col de bruselas, coliflor, colinabo, colza y mostaza)

Cucurbitáceas

(calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino y sandía)

Frutillas

(arándano, frambuesa, fresa, grosella y zarzamora)

Frutales de cáscara dura

(almendro, nogal, pistacho)

Frutales de hueso

(albaricoque, cerezo, ciruelo, melocotón, nectarina)

Frutales pomáceos

(manzano, membrillo, peral)

Frutales tropicales

(aguacatero, cafeto, chirimolla, guayabo, litchi, mango, papayo)

Semillas oleaginosas

(ajonjolí, canola)

Solanáceas

(chile, tomate, patata, pimiento, acelga, apio, lechuga, perejil)

Hortalizas de inflorescencia

(alcachofa)

Hortalizas de raíz

(nabo, rábano, remolacha, zanahoria)

Hortalizas de tubérculos y bulbos

(ajo, camote, cebolla, patata, yuca)

Leguminosas

(chícharo, frijol, garbanzo, lenteja, soya)

Olivar

Piña

Plátano y banano

Vid

De 1 a 2 kg/ha
cada 20 o 30 días

Se recomienda aplicarlo al área que se desea proteger, utilizando siempre la suficiente cantidad de agua como vehículo para incorporar DIOXI TSP.

Además, su formulación le confiere una estabilidad de hasta 20 a 30 días en el suelo aplicado, por lo cual se recomienda llevar a cabo un programa de aplicación cada 20 o 30 días.